

肿瘤标志物指标	项目名称	甲胎蛋白 (AFP)	癌胚抗原 (CEA)	糖类抗原125 (CA125)	糖类抗原19-9 (CA19-9)	糖类抗原15-3 (CA15-3)	铁蛋白 (FERRITIN)	神经元特异性 烯醇化酶 (NSE)	细胞角蛋白19片段 (CYFRA211)	鳞状细胞癌抗原 (SCC)	主病灶大小	用药治疗情况
	参考范围 (单位)	0.0-20.0 (μg/l)	不吸烟0.0-5.0; 吸烟0.0-10.0 (μg/l)	0.0-30.2 (IU/ml)	0.0-37.0 (IU/L)	0.0-32.4 (IU/L)	10.0-291.0 (μg/l)	0.0-10.0 (ng/ml)	0.0-7.0 (ng/ml)	0.0-2.5 (ng/ml)		
2015年12月	当月测量值	2.6	0.7	8.4	14.1	31	250	未测	未测	未测	35.7mm*34.2mm	未用药
2017年1月	当月测量值	3.9	0.8	7.7	34	25.3	97	未测	未测	未测	22m*18mm	易瑞沙 (第12个月)
2018年7月	当月测量值	3.9	0.3	6.7	18.4	19.7	116.8	0.94	3.5	1.24	34mm*11mm	泰瑞莎9291 (第4个月)
2018年11月	当月测量值	4.4	0.6	14.1	24.4	41.5	148.6	1.78	5.75	1.23	44mm*20mm	泰瑞莎9291 (第8个月)
2018年12月	当月测量值	3.2	0.4	30.9	19.9	68.6	131.5	3.36	6.16	1.17	未测	泰瑞莎9291用至 第8个月,准备第 一次化疗前测定
2019年1月	当月测量值	4.4	0.7	20.2	30.9	62.7	238.2	2.38	3.52	0.88	未测	第一次化疗结 束,准备第二次 化疗前测定
2019年2月	当月测量值	6.6	1.1	27	24.5	43.9	161.4				12mm*33mm	第三次化疗结束
2019年6月	当月测量值	3.8	0.5	8.3	26.2	32.8	138	6.47	1.48 (标准变为《3.3》)	0.74 (标准变为《1.8》)	12mm*33mm	泰瑞莎9291自 2019年3月起恢 复用药第3个月
2019年10月	当月测量值	2.5	0.6	13.5	21.5	96.4	161	9.91	5.54 (标准变为《3.3》)	0.83 (标准变为《1.8》)	与7月相仿	泰瑞莎9291自 2019年3月起恢 复用药第7个月
2019年11月	11月11日	4.4	0.8	19.1	25	119.8	175.8	13.26	5.23 (标准变为《3.3》)	0.9 (标准变为《1.8》)	未测	泰瑞莎9291自 2019年3月起恢 复用药第8个月
	11月22日	4.0	0.9	16.9	23.4	113.9	173.8	14.78	5.33 (标准变为《3.3》)	1.12 (标准变为《1.8》)	稍有增大	
2019年12月	12月24日	3.9	0.7	70.3	25.8	128	171.3	13.22	4.34 (标准变为《3.3》)	1.44 (标准变为《1.8》)	进展	以上指标为化疗 前 12月24日,贝伐 300; 12月25日,培美 700。
2020年3月	3月8日	2.7	1.0	15.9	34.0	52.0	226.9	9.9	5.84 (标准变为《3.3》)	1.01 (标准变为《1.8》)	右肺下叶炎症 明显吸收	泰瑞莎9291自 2019年3月起恢 复用药第13个月
2020年4月	4月28日	3.5	0.9	43.2	26.8	32.4	141.3	6.95	2.86 (标准变为《3.3》)	0.88 (标准变为《1.8》)	稳定	3月中旬起,采 用9291+280
2020年5月	5月30日	3.2	1	77.3				7.02	2.16 (标准变为《3.3》)	0.80 (标准变为《1.8》)	稳定	6月1日,化疗, 培美700+贝伐 300; 化疗后,因顾及 280副作用,仅用 280单药维持,6 月-8月先后两次 用贝伐300单药。
2020年8月	8月21日	4.6	0.7	17.1	26.9	36.1	193.6	7.23	1.80 (标准变为《3.3》)	0.40 (标准变为《1.8》)	稳定	7月下旬,恢复 用9291+280方 案,吃5停2,至8 月11日,再次停 药,前后用药2 周左右。 8月20日,贝伐 300。 8月22日起,恢 复9291+280 方案,吃3停2。
2020年10月	10月27日	1.3	0.6	10.5	24.6	33.5	184.9	8.39	2.42 (标准变为《3.3》)	0.90 (标准变为《1.8》)	稳定	延用9291+280 方案,吃3停2; 9月15日,贝伐 300。 10月20日,贝 伐300。
2020年12月	12月25日	2.7	0.8	7.9	21.9	33.5	146.1	8.67	2.97 (标准变为《3.3》)	1.42 (标准变为《1.8》)	稳定	延用9291+280 方案,吃3停2; 11月20日,贝 伐300。 12月18日,贝 伐300。
2021年4月	4月15日	2.2	0.7	8.9	26.1	26.4	121.7	8.78	1.72 (标准变为《3.3》)	0.78 (标准变为《1.8》)	稳定	延用9291+280 方案,吃3停2; 每隔28天贝伐 300。
2021年6月	6月13日	2.6	0.9	9.7	24.1	54.4	91.9	8.13	2.35 (标准变为《3.3》)	0.55 (标准变为《1.8》)	稳定	延用9291+280 方案,吃3停2; 每隔28天贝伐 300。
2021年8月	8月5日	3	0.9	16.8	23.2	45.3	98.2	7.83	1.84 (标准变为《3.3》)	0.82 (标准变为《1.8》)	未测	延用9291+280 方案,吃3停2; 贝伐300(间隔 1个月半左右)。
2021年9月	9月17日	3.7	1.1	30.2	22.7	58.2	128.6	14.76	1.19 (标准变为《3.3》)	0.60 (标准变为《1.8》)	两肺部分小病 灶有增大、增 实迹象。	延用9291+280 方案,吃3停2; 贝伐300(间隔 1个月)。
2021年10月	10月10日	2.5	0.5	14.3	13.3	42.5	96.5	10.75	1.39 (标准变为《3.3》)	1.42 (标准变为《1.8》)	较前次时间间 隔较近,未测 。	9月18日,试用 804,每日一粒。 280继续用,吃3 停2(因副作用, 断断续续使用)
2021年11月	11月27日	3.4	1.1	9.9	41.6	41.3	100.4	8.96	2.09 (标准变为《3.4》)	1.59 (标准变为《1.8》)	较前次时间间 隔较近,未测 。	延续前次使用 804,因副作用太 大(皮肤开裂、 甲沟炎、体感很 差),吃5停2。